

Los medicamentos que NO se deben tomar tres semanas antes de la cirugía



*Mr David H Verity, MD MA FRCOphth
Consultant Ophthalmic Surgeon*

Introducción

Muchos de los analgésicos que tomamos contienen compuestos que reducen la capacidad de la sangre para formar un coágulo, y esto puede causar hemorragia durante y después de la cirugía. Desafortunadamente, la cirugía se deberá posponerse si estos medicamentos se toman durante las de 3 semanas anteriores a la cirugía. En caso de duda, consulte con su médico de cabecera.

- Paracetamol y codeína: NO afectan a la coagulación de la sangre y se pueden tomar en cualquier momento antes de la cirugía.
- Warfarina y clopidogrel: Estos nunca se deben suspender o cambiar sin consultar a su médico de cabecera o a su cardiólogo.

Alimentos / comprimidos que deben evitarse 3 semanas antes de la cirugía:

(1) ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS HERBOLARIOS

- Todos los alimentos picantes (por ejemplo, curry)
- Ajo, jengibre, ginseng, ginkgo biloba, "la Garra del Diablo "

(2) MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ASPIRINA

La aspirina está presente en muchos medicamentos. Algunos de los medicamentos presentados a continuación son los nombres comerciales comunes que contienen aspirina.

- Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda
- ASPIRINA
- ACTRON
- ALKA SELTZER
- ANADIN
- ANADIN EXTRA SOLUBLE
- ANADIN MAX FUERZA

Folletos informativos para pacientes

Información General, no.1:

'Medicamentos a evitar antes de la cirugía '

www.MrVerity.com

- ANGETTES
- ASKIT
- ASPAV
- ASPIRINA B.P
- ASPIRINA BAYER
- ASPRO
- ASPRO CLARO
- BEECHAMS LIMÓN TABLETAS
- BEECHAMS EN POLVO
- SELTZER BOOTS
- CAPRIN
- CO-CODAPRIN
- CODIS 500
- COJENE
- DISPRIN
- DISPRIN DIRECTO
- DISPRIN EXTRA
- DRISTAN TABLETAS
- FEMIGRAINE DOLOXNENE
- FYNNON CALCIO
- POLVOS MRS CULLEN
- ENFERMERA SYKES EN POLVO
- NU-SEALS ASPIRINA
- PHENSIC
- LABOPRIN DL
- EQUAGESIC

(3) ANTI INFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES (AINES)

- Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda
- ACECLOFENACO: Preservex
- ACEMATACIN: Emflex
- AZAPROPAZONA: Rheumox
- CELECOXIB: Celebrex
- DEXIBUPROFENO: Seractil
- DEXKETOPROFENP: Keral
- DICLOFENACO: Arthrotec, Diclomax SR, Diclomax retard, Motifene, Voltaren, Voltaren retard, Voltaren rápido
- ETODOLAC: Etodolac, Lodine SR
- ETORICOXIB: Arcoxia
- FENBUFENO: Fenbufeno, Lederfen
- FENOPROFENO: Fenopron
- FLUBIPROFENO: Froben, Froben SR
- IBUPROFENO: Brufen, Brufen retard, Fenbid, Codafen continua, Nurofen
- INDOMETACINA: Indometacina, Indocid

Folletos informativos para pacientes

Información General, no.1:

'Medicamentos a evitar antes de la cirugía '

www.MrVerity.com

- KETOPROFENOP: Ketoprofeno, Orudis, Oruvail Gel
- ÁCIDO MEFENÁMICO: Ácido mefenámico, Ponstan
- MELOXICAM: Mobic
- NABUMETONA: Nabumetona, Reliflex
- NAPROXÉN: naproxeno, Naprosyn, Synflex, Napratec
- NEUROFEN
- PIROXICAM: Piroxicam, Feldene, Brexidol
- SULINDAC: Sulindac, Clinoril
- TENOXICAM: Mobiflex
- ÁCIDO TIAPROFÉNICO: Ácido tiaprofénico, Surgram

(4) AGENTES ANTIPLAQUETARIOS (consulte con su médico de cabecera o cardiólogo)

Clopidogrel (usado después de stent coronario arterial)