

الأدوية التي يجب أن توقف بثلاث أسابيع قبل الجراحة



السيد الدكتور: ديفيد فيرتي استشاري جراحة العيون

مقدمة

الكثير من المسكنات تحتوي على مركبات تقلل من قدرة الدم على تشكيل الجلطة، وهذا يمكن أن يسبب نزيفا أثناء وبعد العمليات الجراحية. وللأسف من المرجح أن تؤجل، العملية الجراحية إذا ما اتخذت هذه الأدوية في غضون ٣ أسابيع من الجراحة. إذا كنت في شك، يرجى استشارة طبيبك الخاص.

- الباراسيتامول والكودين لا يؤثر على تخثر الدم، ويمكن أن يؤخذ في أي وقت قبل الجراحة.
- الوارفارين وكلوبيدوجريل: لا ينبغي أبدا وقفها أو تغييرها دون نصيحة من طبيبك أو طبيب أمراض القلب.

المواد الغذائية / الأقرص التي ينبغي تجنبها لمدة ٣ أسابيع قبل الجراحة:

(أ) الأغذية وأدوية الأعشاب

- كل الأطعمة الغنية بالتوابل (مثل الكاري)
- الثوم والزنجبيل والجينسنغ، الجنكة بيلوبا، "مخلب الشيطان"

(ب) الأدوية التي تحتوي على أسبرين

الاسبرين موجود في العديد من الأدوية. وفيما يلي الأسماء التجارية المشتركة التي تحتوي على الأسبرين وتشمل:

- أقراص لآلام المفاصل والظهر
- الاسبرين
- ACTRON
- ALKA SELTZER
- ANADIN
- ANADIN EXTRA SOLUBLE
- ANADIN MAX STRENGTH
- ANGETTES
- ASKIT
- ASPAV
- ASPIRIN B.P
- ASPRO
- ASPRO CLEAR
- BAYER ASPIRIN
- BEECHAMS LEMON TABLETS

- BEECHAMS POWDERS •
- BOOTS SELTZER •
- CAPRIN •
- CO-CODAPRIN •
- CODIS 500 •
- COJENE •
- DISPRIN •
- DISPRIN DIRECT •
- DISPRIN EXTRA •
- DRISTAN TABLETS •
- FEMIGRAINE DOLOXNENE •
- FYNNON CALCIUM •
- MRS CULLEN'S POWDERS •
- NURSE SYKES POWDERS •
- NU-SEALS ASPIRIN •
- PHENSIC •
- LABOPRIN DL •
- EQUAGESIC •

(ج) العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

- وتشمل أقراص لآلام المفاصل والظهر •
- ACECLOFENAC: Preservex •
- ACEMATAcin: Emflex •
- AZAPROPAZONE: Rheumox •
- CELECOXIB: Celebrex •
- DEXIBUPROFEN: Seractil •
- DEXKETOPROFEN: Keral •
- DICLOFENAC: Arthrotec, Diclomax SR, Diclomax Retard, Motifene, Voltarol, Voltarol Retard, Voltarol Rapid •
- ETODOLAC: Etodolac, Lodine SR •
- ETORICOXIB: Arcoxia •
- FENBUFEN: Fenbufen, Lederfen •
- FENOPROFEN: Fenopron •
- FLURBIPROFEN: Froben, Froben SR •
- IBUPROFEN: Brufen, Brufen Retard, Fenbid, Codafen Continuous, Nurofen •
- INDOMETACIN: Indometacin, Indocid •
- KETOPROFEN: Ketoprofen, Orudis, Oruvail Gel •
- MEFENAMIC ACID: Mefenamic Acid, Ponstan •

- MELOXICAM: Mobic
 - NABUMETONE: Nabumetone, Reliflex
 - NAPROXEN: Naproxen, Naprosyn, Synflex, Napraterc
 - NEUROFEN
 - PIROXICAM: Piroxicam, Feldene, Bexidol
 - SULINDAC: Sulindac, Clinoril
 - TENOXICAM: Mobiflex
 - TIAPROFENIC ACID: Tiaprofenic Acid, Surgram
- (د) أدوية مضادات التجلط (استشارة الطبيب العام أو أخصائي القلب ضرورية)
كلويدوجرال (يستخدم بعد جراحة الشرايين التاجية)